

DESCRIPTION D'UN CÉTONIDE NOUVEAU PROVENANT DU CONGO FRANÇAIS  
ET APPARTENANT AUX COLLECTIONS DU MUSÉUM,

PAR M. A. BOURGOIN.

**Plagiochilus Dupeyi** n. sp.

♀. *Elongatus, niger, nitidus. Capite fortiter granuloso-punctato, flavo-piloso, clypeo longitudine latiore, margine antico reflexo, vix sinuato, pronoto medio rotundato-ampliato, antice plus quam postice attenuato, sat fortiter punctato, lateribus flavo-pilosis; scutello acuto, leviter punctato; elytris laxè punctatis, flavo-pilosis, singulo prope suturam dupliciter geminato-striato; subtus ubique haud dense flavo-pilosus.*

Congo français, région de Brazzaville; Capitaine Dupey (1906).  
Long. 10 mm.; lat. 4,4 mm. Type : une femelle.

Tout noir, brillant, à pubescence flave, très pâle. Tête fortement pubescente, rugueuse, plus grossièrement granuleuse sur le front que sur le devant du clypéus; celui-ci transversal, son bord antérieur tranchant, relevé un peu plus en son milieu vu d'arrière, à peine sinué vu perpendiculairement; yeux très peu saillants. Pronotum assez fortement ponctué, plus finement et plus densément en avant et latéralement; élargi et arrondi un peu avant son milieu; de là plus rétréci en avant qu'en arrière, ses côtés légèrement excurvés sur toute leur longueur et portant une bordure de poils couchés, assez drus; angles postérieurs obtus mais à sommet vif; base largement incurvée devant l'écusson. Celui-ci allongé, à côtés incurvés, sa base fortement ponctuée, le reste de sa surface à peine, surtout au sommet. Élytres à ponctuation irrégulière, atténuée en arrière, plus dense et plus fine sur les côtés et à l'extrême sommet, à pubescence plus dense en arrière, alignée sur le disque; intervalle sutural à ponctuation obsolète, longé depuis le niveau de la pointe de l'écusson, par une double strie séparée d'une autre double strie par un intervalle très étroit; sur le tiers postérieur des déclivités latérales, une faible dépression allongée; sommets séparément arrondis. Pygidium modérément convexe, à carène obsolète longitudinale; il porte des stries espacées très minces, sinueusement transversales et des poils flaves; sommet en retrait. Saillie mésosternale cunéiforme, rétrécie en arrière, rectiligne et ne dépassant pas les hanches médianes en

avant; côtés du pectus fortement ponctués, ventre convexe, presque imponctué sur toute sa surface; tibias antérieurs fortement bidentés, médians et postérieurs ayant une dent à peine visible un peu en arrière du milieu de leur bord externe; tarses à peine plus longs que les tibias correspondants.

Le genre *Plagiochilus* a été créé par Wasmann (*Ill. Zeitschr. Ent.* V [1900] p. 65; 82<sup>(1)</sup>) pour *Cænochilus intrusus* Péringuey (*Ann. Soc. ent. Fr.*, [1900] p. 71) petite espèce de forme allongée à pronotum moins orbiculaire que celui de la plupart des autres *Cænochilus* et à angles postérieurs aigus; ce dernier caractère est assez variable.

<sup>(1)</sup> La page 67 (recto) porte au verso le n° 81 et la pagination continue à partir de ce dernier.